

がん種	療法名	薬剤	投与量	投与時間	施行日	投与間隔	催吐リスク
食道癌	CDDP+5-FU	ランダ	80mg/m ²	2時間	d1	21~28日	高
		5-FU	800mg/m ²	24時間	d1-5		
食道癌	CDDP+5-FU+RT	ランダ	70mg/m ²	2時間	d1	28日	高
		5-FU	700mg/m ²	24時間	d1-4		
食道癌	DCF	ドセタキセル	70mg/m ²	1時間	d1	21日	高
		ランダ	70mg/m ²	2時間	d1		
		5-FU	750mg/m ²	24時間	d1-5		
食道癌	DTX	ドセタキセル	60mg/m ²	1時間	d1	14日	軽
食道癌	DTX+CDGP	アクブラ	80mg/m ²	2時間	d1	21日	中
		ドセタキセル	60mg/m ²	1時間	d1		
食道癌	mFOLFOX6	エルプラット	85mg/m ²	2時間	d1	14日	中
		レボホリナート	200mg/m ²	2時間	d1		
		5-FU	400mg/m ²	全開	d1		
		5-FU	2400mg/m ²	46時間	d1-2		
食道癌	wPTX	パクリタキセル	100mg/m ²	1時間	d1,8,15,22,29,36	49日	軽
食道癌	オブジーボ	オブジーボ	240mg/body	30分	d1	14日	-
		オブジーボ	480mg/body	30分	d1	28日	
食道癌	オブジーボ(2w)+CDDP+5-FU	オブジーボ	240mg/body	30分	d1,15	28日	高
		ランダ	80mg/m ²	2時間	d1		
		5-FU	800mg/m ²	24時間	d1-5		
食道癌	オブジーボ(4w)+CDDP+5-FU	オブジーボ	480mg/body	30分	d1	28日	高
		ランダ	80mg/m ²	2時間	d1		
		5-FU	800mg/m ²	24時間	d1-5		
食道癌	オブジーボ(2w)+ヤーボイ	オブジーボ	240mg/body	30分	d1,15,29	42日	-
		ヤーボイ	1mg/kg	30分	d1		
食道癌	オブジーボ(3w)+ヤーボイ	オブジーボ	360mg/body	30分	d1,22	42日	-
		ヤーボイ	1mg/kg	30分	d1		
食道癌	キイトルーダ+CDDP+5-FU	キイトルーダ	200mg/body	30分	d1	21日	高
		ランダ	80mg/m ²	2時間	d1		
		5-FU	800mg/m ²	24時間	d1-5		